


















Šumski pojmovnik









POJAM	SLIKA	OBJAŠNENJE
List		vegetativni organ biljke koji obavlja asimilacijsku i transpiracijsku funkciju.
Drvo		u botanici je svaka višegodišnja biljka, koja se sastoji iz korijena, vidljivog drvenog debla i grana, koje čine krošnju drveta.
Korijen		je jedan od tri osnovna organa kopnenih biljaka.
Kora		je iznimno složeni heterogeni materijal koji objedinjuje sva tkiva stabljike što se nalaze s vanjske strane kambija.
Grm		označava jedan od oblika rasta drvenastih biljaka
Plod		u botanici je reproduktivni organ kritosjemenjača koji se nakon oplodnje razvija iz plodnice, a sastoji se od sjemenke i usplođa.
Mahovina		čine skupinu najjednostavnije građenih kopnenih biljaka stablašica .
Srna		je šumska životinja koja je geografski rasprostranjena na području srednje Europe.
Vepar		je bliski rođak domaće svinje, živi u čoporima uglavnom oko vlažnih šuma.

Šumski pojmovnik

Jelen lopatar		je porodica životinja iz reda parnoprstaša. Njegova ženka je košuta.
Vuk		ide u red najvrjednijih najprilagodljivijih predatora među sisavcima. Najveći je pripadnik porodice pasa.
Vjeverica		je jedina europska autohtona vrsta iz porodica Sciuridae, a kroz mnoga stoljeća je bila i jedina vrsta na starom kontinentu.
Kesten		Drvo kestena je u srodstvu s bukvom i hrastom, dugovječno, može narasti do 25 m uvis s bujnom, velikom krošnjom i godišnje dati preko 200 kg plodova i može doseći i starost preko 500 godina.
Žir		je plod hrasta ili bukve. Obično sadrži jedno sjeme ograđeno tvrdom, kožnatom ljuskom.
Vrganj		je jestiva gljiva koja raste u bjelogoričnim i crnororičnim šumama. Raste na proplancima i obično na sunčanim obroncima prekrivenima mahovinom.
Muhara		je otrovna gljiva iz porodice kojoj pripadaju također smrtno otrovna zelena pupavka.
Zelena pupavka		jedna je od najotrovnijih gljiva široko rasprostranjena po Europi.








Izradili učenici 7.razreda OŠ Slavka Kolara Hercegovac-Kristijan Žgela, Daniel Šturlić, Dinko Jurčević, Robert Valentić, Matija Salopek.

Šumski pojmovnik








Paprat		spada u jednu od najstarijih skupina viših biljaka. U karbonu zajedno sa drvenastim i drugim biljkama stvarale su velike šume, čiji fosilni ostaci sada predstavljaju naslage ugljena.
Djetlić		je red u razredu ptica koji se najčešće dijeli na dva podreda i šest porodica.
Sova		obitavaju na području srednje Europe u bjelogoričnim i miješanim šumama. Susrećemo ju i u parkovima, vrtovima, starim grobljima te u blizini čovjekovih prebivališta.
Krpelj		su nametnici koji parazitiraju na domaćinu i prenose veći broj bolesti. Domaćin može biti čovjek ili bilo koji viši sisavac, npr. pas, mačka, govedo, kao i ptice i gmazovi
Riđovka		zmija je otrovnica iz porodice ljutica. Naraste do 75 cm. Najbolje je proučena zmija na svijetu. Poznata je još i pod nazivom "šarka".
Žaba		ili bezrepci pripadaju vodozemcima, a razlikuju se od drugih vodozemaca po tome što nemaju rep. Tijelo im je zdepasto, pokriveno glatkom, golom i mekanom kožom.
Fazan		je široko rastprostranjena ptica. Fazan potiče iz Srednje Azije, ali je još u vrijeme antičkog Rima donesen u Europu
Jež		su porodica sisavaca. Najpoznatiji pretstavnici porodice koji žive u Europi su tamnoprski i bjeloprsi ježeви.

Izradili učenici 7.razreda OŠ Slavka Kolara Hercegovac-Kristijan Žgela, Daniel Šturlić, Dinko Jurčević, Robert Valentić, Matija Salopek.








Šumski pojmovnik

Jastreb		je ptica grabljivica iz porodice jastrebova .Srednje je veličine. Vrlo je rasprostranjena vrsta koja nastanjuje umjerena područja sjeverne hemisfere.
Leptir		su red kukaca s dva para krila obraslih ljuskastim dlačicama koje se prekrivaju poput crjepova.
Mrav		su porodica kukaca koja živi u velikim zadružnim zajednicama. Pripadaju redu opnokrilaca, dio su nadporodice žalčara.
Ciklama		rod je s 23 vrste cvjetnica, tradicionalno klasificiran u porodicu Primulaceae, ali zadnjih godina reklasificiran je u porodicu Myrsinaceae.
Pčela		potporodica su kukaca, iz reda opnokrilaca, porodice pčela, bliski srodnici bumbara, a dalji osa i mrava.Na svijetu ima približno 20 000 vrsta pčela na svim kontinentima osim Antarktike. Hrane se nektarom kao izvorom energije, te peludom, kao izvorom proteina.
Divlja ruža		ili pasja ruža grmolika je biljaka iz roda Rose i obitelji Rosaceae. Drugi nazivi pod kojima je poznata jesu: šipak, divlji šipak, ščipak, šibek, šip, šipkovina, šipurika, šipurina, pasja drača, pasja roža i drugi.
Kupina		je biljka penjačica, te naraste od 50-300 cm. Stabljika joj je, manje-više bodljikava zavisno od sorte, te mjestimično odrvenjela. Bodlje služe za penjanje, ali i kao odbrambeni mehanizam protiv životinja koje se hrane lišćem kupine.





Šumski pojmovnik

Lijeska		je vrsta lijeske koja raste na područjima Europe i Azije. Obično je to grmolika biljka koja doseže 3-8 m visine, ali može narasti do čak 15 m.
Komarac		su porodica kukaca koja je svrstana u red dvokrilaca. Porodica ima oko 40 rodova i obuhvaća oko 31.000 vrsta. Razvili su se prije oko 170 milijuna godina.
Jazavac		skupno je ime pripadnika triju rodova koje pripadaju porodici Mustelidae: istoj sisavačkoj porodici u koju ubrajamo tvorove, lasice, vidre i nekoliko ostalih vrsta zvijeri.
Dabar		je vodena i kopnena životinjska vrsta i najveći glodavac sjeverne polutke. Masivne i zdepaste je građe, izvrstan plivač i ronilac što mu omogućava građa tijela. Dužina tijela dosegne do 1 metar, visina u hrptu je do 30 cm, a rep je širok i plosnat dužine do 30 cm.
Košnica		je nastamba za pčele u kojima zbog lakše manipulacije pčelama i medom čovjek smješta pčelinje zajednice. Nekad da bi došao do meda ljudi su morali ugušiti pčele.
Breza		Naraste do 20 m, a u debljinu do 60 cm. Deblo je vitko, a kora bijela i glatka. Na starijim stablima, kora ima tamne pukotine. Izbojci su vitki, dugački, bradavičasto-žljezdasti i vise.
Joha		je bjelogorično drvo iz porodice Betulaceae. Naraste do 25 m. Deblo dosiže do vrha krošnje. Kora je crno-smeđa. Izbojci obiluju bjelkastim lenticelama. Pupovi su na dugim stapkama i ljepljivi.

Šumski pojmovnik

Medvjed		su porodica sisavaca iz reda zvijeri. Ranije ih se nazivalo "velikim medvjedima" ili još i "pravim medvjedima", da bi ih tako razlikovali od rakuna koje su nazivali "malim medvjedima".
Bukva		je bjelogorično drvo. Raste na brdskim i planinskim položajima, srednje, zapadne Europe, te jugoistočne Europe.
Češer		je kratak izdanak četinjača, inačica strobilusa, koji nosi reproduktivne organe. Češeri su jednospolni. Češeri oba spola najčešće se nalaze na istoj biljci, što se naziva jednodomost.
Ciklama		rod je s 23 vrste cvjetnica, tradicionalno klasificiran u porodicu Primulaceae, ali zadnjih godina reklasificiran je u porodicu Myrsinaceae.
Orao		je vrsta orla koji je velik 1 m s rasponom krila preko 2 m i težak 2,5 do 7 kg. Pripada orlovima u porodici sokolovki. Ta vrsta orla živi u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji i ugrožena je vrsta.
Lisica		je ime za 27 vrsta pasa srednje veličine, koji imaju tijelo pokriveno te karakterističan gusti rep ili tzv. "četku". Najpoznatija vrsta lisice je crvena lisica, raširena na cijelom kontinentu Europe.
Grab		je bjelogorično drvo iz porodice Betulaceae. Rasprostranjen je u Europi i jugozapadnoj Aziji. Raste u mezofilnim šumama. U nizinskom području uspijeva na izdignutim terenima, a brežuljkasto područje najbolje mu odgovara.

Šumski pojmovnik

Božja ovčica		se hrane biljnim štetnicima (lisne uši), a njezine ličinke, čiji razvoj traje 3 do 5 tjedana, dnevno pojedu 20 do 30 lisnih ušiju.
Čuk		je ptica velika od 19-21 cm s rasponom krila od 47-54 cm. Sivkasto-smeđe je boje. Ima malu sivkastu glavu s velikim očima, ostrim kljunom pomoću kojega komada plijen na komadiće. Ima dva uzdignuta čuperka na vrhu glave. Na nogama obično ima tri prsta s kandžama. Rep je dosta kratak.
Gušter		su najčešći gmazovi na svijetu. Glava gušterice je spljoštenja i šiljasta. Odijeljena je od trupa širokim vratom. Sa strane glave su oči, koje imaju gornji i donji pokretljivi očni kapak, prozirnú migavicu te suzne žlijezde.
Ris		ili eurazijski ris je najveća mačka u Europi pa i na hrvatskom tlu. To je vrsta iz roda risova unutar porodice mačaka. Kad se u Hrvatskoj kaže 'ris', u pravilu se misli upravo na ovu vrstu.